

# Wichtige Hinweise vor Beginn der Therapie – eine kleine Check Liste



- FIP -

WENN JEDE MINUTE ZÄHLT !

---

Hand in Hand gegen FIP

Besuchen Sie uns auf Facebook: [https://www.facebook.com/groups/1616127545520183/?ref=share\\_group\\_link](https://www.facebook.com/groups/1616127545520183/?ref=share_group_link)

# Diagnostik

FIP gilt immer noch als Ausschlussdiagnostik. Daher - auch bei FIP Verdacht - die Diagnostik nicht vernachlässigen.

Andere Möglichkeiten (je nach Symptomen) wie IHA, Toxoplasmose oder Lebershunt mit Eurem Arzt besprechen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Hand in Hand gegen FIP

# Blutbild

geriatrisches Blutbild,  
Elektrophorese,  
FCoV Antikörpertiter,  
Hämatologie,  
Serum-Amyloid-A (SAA),  
NT-ProBNP Wert (bei Verdacht auf eventuelle Herzerkrankung)



- FIP -

WENN JEDE MINUTE ZÄHLT!

Hand in Hand gegen FIP

# Bei Aszites (Flüssigkeit im Thorax/Bauchraum)

Punktion für real Virus PCR, sofern möglich (z Bsp. bei Verdacht auf feuchte FIP)

Goldstandard für den Nachweis aus Erguss oder Gewebe ist die immunhistochemische Färbung.

Ansonsten empfiehlt sich eine zytologische, bakteriologische und virologische Untersuchung von Proben.

Entlastungspunktion bei Bedarf (z Bsp. bei zu hoher Atemfrequenz)

Wichtig: nicht mehr als 30% des Volumens sowie Infusion zur Stabilisierung (bei Bedarf)



# Ultraschall / Röntgen

zur Beurteilung der eventuell vorhandenen Flüssigkeit / Zustand der Organe / Lymphknoten

Ggfls. Herzultraschall bei Thoraxerguss - FIP -  
mögliche Herzerkrankung in Erwägung ziehen

Hand in Hand gegen FIP

# Temperatur messen

bei leichter Untertemperatur geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung, in Absprache mit dem Arzt, ergreifen – z Bsp. durch eine Wärmelampe.

Die Temperatur stündlich kontrollieren.

Sinkt die Temperatur weiter, unbedingt in der Klinik vorstellig werden für weitere Maßnahmen (z.Bsp. Infusionen, Wärmelampe, Sauerstoffbox)

Temperatur sinkt unter GS.

Bitte den Hinweis unter „Medikamente“ beachten!

# Stabilisierung

nach Beurteilung und Absprache mit dem Tierarzt : z Bsp. durch Infusion,  
Zufüttern, Zwangsfüttern, Wärmen



- FIP -  
WENN JEDE MINUTE ZÄHLT!

Hand in Hand gegen FIP

# zusätzliche Medikamente: Fieber/Schmerzmittel

Fiebersenker: Meloxicam (z Bsp. Metacam / Meloxi) bei Bedarf nach  
Absprache mit dem behandelnden Arzt

Bitte folgende Medikamente vermeiden, da unter GS (die Temperatur sinkt)  
die Gefahr einer Untertemperatur bestehen könnte.

Tolfenaminsäure ( Z Bsp. Tolfedine) /

Metamizol ( z Bsp. Novalgin)

\*Medikamente immer mit dem Arzt abstimmen\*

Hand in Hand gegen FIP



# zusätzliche Medikamente: Antibiotika bei Verdacht bakterieller Nebeninfektion

\*Medikamente nur nach ärztlichen Verschreibungen\*

unbedenklich:

Zithromax / Cephalexin / Amoxicillin / Penicillin / Clavamox / Doxycyclin /  
Clindamycin / Synolux / Clavaseptin / Convenia

bitte vermeiden, sofern keine medizinische Indikation vorliegt (bestimmte  
nachgewiesene Bakterien):

Veracin / Baytril / Zeniquin / Marbocyl / Orbax / Veraflox

Grund: Fluorchinolone Antibiotika passieren die Blut-Hirn-Schranke und  
enthalten Fluoride. Es können neurologische Nebenwirkungen  
verursacht oder verstärkt werden.

# Zusätzliche Medikamente: verschiedenes

\*immer nur nach ärztlicher Indikation\*

## **Prednison/Kortison:**

sollte ausgeschlichen werden, da es Symptome verschleiert, kann aber bei medizinischer Indikation individuell unterstützend gegeben werden.

## **L-Lysin:**

unbedingt vermeiden, da es den Arginin Spiegel weiter senkt.

## **Zylexis:**

unbedingt vermeiden während der Therapie aufgrund der Wirkungsweise (Stimulierung und Steigerung der unspezifischen Immunmechanismen)

## **Interferon:**

nur bei akutem nachgewiesenem Ausbruch z Bsp. von Calici (bitte Rücksprache halten)

Besuchen Sie uns auf Facebook: [https://www.facebook.com/groups/1616127545520183/?ref=share\\_group\\_link](https://www.facebook.com/groups/1616127545520183/?ref=share_group_link)

